

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-informace pro pacienta

Cellufluid oční kapky, roztok ,jednodávková nádobka carmellosum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, neboť obsahuje důležité informace.

Tento přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Cellufluid užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Cellufluid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cellufluid používat
3. Jak se Cellufluid používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cellufluid uchovávat
6. Další informace

1. CO JE CELLUFLUID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Cellufluid je náhražka slz, která obsahuje látku zvanou sodná sůl karmelózy. Ta je používána k léčbě příznaků syndromu suchého oka (jako je bolestivost, pálení, podráždění nebo pocit suchého oka).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CELLUFLUID POUŽÍVAT

Nepoužívejte Cellufluid:

- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na sodnou sůl karmelózy nebo na kteroukoliv další složku Cellufluidu

Zvláštní opatření při použití Cellufluidu je zapotřebí:

- Pokud dojde k podráždění, bolestivosti, zarudnutí a změnám vidění nebo pokud se tyto stavy zhorší, přestaňte používat lék a porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Používáte-li jiné oční kapky, ponechejte mezi nakapáním jiných kapek a Cellufluidu pauzu alespoň 15 minut.

Těhotenství a kojení

Cellufluid lze používat během těhotenství i kojení.

.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Neočekává se, že Cellufluid vyvolá rozmazané vidění. Pocítíte-li dočasné rozmazané vidění, neříd'te žádné dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se vám vidění nevyjasní.

Pro svou orientaci si přečt'te celou příbalovou informaci

Pokud máte jakékoli pochybnosti, projednejte je se svým lékařem, sestrou nebo lékárníkem.

3. JAK SE CELLUFLUID POUŽÍVÁ

Říd'te se těmito pokyny, pokud vám v lékárně nebo lékař neposkytnou jinou informaci.

Obvyklá dávka je 1-2 kapky Cellufluidu do postiženého oka/očí 4x denně nebo podle potřeby.

Před použitím Cellufluidu si nemusíte vyndávat kontaktní čočky.

Před použitím zkontrolujte, zda je jednodávková nádobka nedotčená. Po otevření je třeba roztok okamžitě použít. Aby se zabránilo znečištění, otevřená část jednodávkové ampulky se nesmí dotknout oka nebo čehokoli jiného. Před použitím si umyjte ruce.



1. Odtrhněte z pásky jednu jednodávkovou nádobku.
2. Podržte ji ve svislé poloze (uzávěrem nahoru) a uzávěr odtrhněte.
3. Zlehka stáhněte spodní víčko dolů, aby se vytvořila kapsa. Otočte jednodávkovou ampulku dnem vzhůru a stiskem uvolněte do oka jednu kapku. Několikrát zamrkejte.

Nepoužívejte znovu jednodávkovou nádobku, i kdyby v ní zůstalo trochu roztoku.

Jestliže jste použil(a) více Cellufluidu než jste měl(a), nijak vám to neublíží. Máte-li nějaké obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Cellufluid, pak, jakmile si vzpomenete, kápněte do každého oka, které potřebuje léčit, jednu kapku a pak pokračujte v obvyklé činnosti. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Cellufluid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může dojít k dočasnému pálení.

Jestliže se tento nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, který nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CELLUFLUID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Cellufluid nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti, jež je uvedené na štítku jednodávkové ampulky a na vnějším obalu: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dnu uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Cellufluid obsahuje

-Léčivou látkou je carmellosum natricum 5 mg/ml

-Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, mléčnan sodný, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého a čištěná voda

Může být přidáno malé množství hydroxidu sodného nebo kyseliny chlorovodíkové k úpravě pH (míra acidity nebo alkality roztoku)

Složení Cellufluidu bylo navrženo tak, aby odpovídalo Vašemu přirozenému složení slz.

Jak Cellufluid vypadá a jaká je velikost balení

Cellufluid je čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok v malém průhledném (bublinovém) obalu (známém jako jednodávková nádobka).

Jednodávková nádobka má odtrhovací uzávěr.

Jedna jednodávková nádobka obsahuje 0,4 ml roztoku.

Balení obsahuje 5, 30 nebo 90 jednodávkových nádobek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

NEOMED s.r.o.
Sodomkova 6
102 00 Praha 10
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.3. 2006