

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**  
**PURIVIST 0,5 mg/ml oční kapky, roztok**  
**Epinastini hydrochloridum**

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

**V příbalové informaci naleznete :**

1. Co je Purivist 0,5 mg/ml oční kapky, roztok a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Purivist používat
3. Jak se Purivist používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Purivist
6. Další informace

**1. CO JE PURIVIST 0,5 mg/ml OČNÍ KAPKY, ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Purivist obsahuje antihistaminikum, což je protialergická látka. Používá se k léčbě příznaků sezónního alergického zánětu spojivek, známého rovněž jako senná rýma (svědění, zčervenání, slzení nebo otok očí anebo očních víček).

**2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PURIVIST 0,5 mg/ml OČNÍ KAPKY, ROZTOK POUŽÍVAT**

**Nepoužívejte Purivist 0,5 mg/ml oční kapky, roztok**

- **pokud jste přecitlivělí (alergičtí)** na epinastin hydrochlorid nebo na jiné složky přípravku uvedené v bodu 6.

**Zvláštní opatření při použití přípravku Purivist 0,5 mg/ml oční kapky, roztok je zapotřebí:**

- jestliže nosíte kontaktní čočky.** Před použitím Purivistu je musíte vyjmout z oka. Po použití kapek počkejte nejméně 15 minut a teprve poté si nasadte kontaktní čočky zpět (viz také bod 2- Důležité informace o některých složkách Purivistu)
- Pokud současně s přípravkem Purivist používáte jiné oční kapky, dodržujte nejméně 10ti minutový odstup mezi jejich podáváním.

### **Vzájemné působení s dalšími léčivými**

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud současně s přípravkem Purivist používáte jiné oční kapky, přečtěte si prosím výše zmíněné upozornění.

### **Těhotenství a kojení**

#### Těhotenství

Jestliže jste nebo můžete být těhotná, poraďte se před použitím přípravku Purivist s lékařem nebo lékárníkem.

#### Kojení

Není známo, zda Purivist přechází do mateřského mléka. Před použitím přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Krátce po použití přípravku Purivist můžete vidět rozmazaně. Dokud nevidíte znovu zřetelně, neměli byste řídit nebo obsluhovat stroje.

### **Důležité informace o některých složkách Purivistu**

Purivist obsahuje konzervační prostředek benzalkonium-chlorid, který může zabarvit měkké kontaktní čočky a může způsobit podráždění očí.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky (také nazývané hydrofilní čočky) musíte je před použitím Purivistu vyjmout z oka. Po použití kapek počkejte nejméně 15 minut a teprve poté si nasadte kontaktní čočky zpět.

## **3. JAK SE PURIVIST 0,5 mg/ml OČNÍ KAPKY, ROZTOK POUŽÍVÁ**

Purivist používejte vždy podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Purivist by neměl být používán u dětí mladších 12 let

Obvyklá dávka je dvakrát denně (ráno a večer) jedna kapka přípravku Purivist do postiženého oka.

V době alergické sezóny byste měli Purivist používat každý den po dobu trvání příznaků, ne však déle než 8 týdnů.

### **Použití přípravku Purivist 0,5 mg/ml oční kapky, roztok:**

Pokud používáte lahvičku poprvé, otáčejte šroubovacím uzávěrem proti směru hodinových ručiček tak dlouho, jak to bude možné, až se hrot kapátka prorazí. Nyní je lahvička připravena k použití.

Před použitím lahvičky si umyjte ruce. Zakloňte hlavu a podívejte se na strop.



1. Opatrně stáhněte spodní víčko dolů tak, aby se vytvořila malá kapsička.
2. Otočte lahvičku dnem vzhůru a zmáčkněte, aby se uvolnila jedna kapka do každého léčeného oka.
3. Uvolněte dolní víčko a oči zavřete na 30 vteřin.
4. Opakujte kroky 1.-3. pro druhé oko, pokud také vyžaduje léčbu.

Jestliže kapka vaše oko minula, zkuste to znovu.

Abyste zabránili infekci, nedovolte, aby se hrot lahvičky při kapání dotkl oka, jeho okolí ani ničeho jiného. Ihned po použití zavřete lahvičku šroubovacím uzávěrem. Pokud jste lahvičku otevřeli, nesmíte lék používat déle než 28 dní po otevření, viz bod 5.

#### **Jestliže jste použili více přípravku Purivist než jste měli**

- je nepravděpodobné, že si vážněji ublížíte. Další dávku si kápněte v obvyklém čase. Pokud si nevíte rady, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

#### **Jestliže jste si zapomněli kápnout Purivist,**

-kápněte si jednu kapku, jakmile si vzpomenete kromě případu, kdy se již téměř přiblížil čas pro další dávku. V tomto případě zapomenutou dávku vynechejte. Dále se vraťte k vašemu pravidelnému dávkování.

Neberte si dvojnásobnou dávku, abyste nahradili chybějící.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

## **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

**Purivist 0,5 mg/ml oční kapky, roztok** může způsobit podobně jako všechny léky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádný z nežádoucích účinků nebývá vážný, většina z nich je mírná a postihuje pouze ošetřované oko.

#### **Pokud dojde k následující situaci, přerušete používání Purivistu a okamžitě vyhledejte Vašeho lékaře nebo nejbližší nemocnici**

- astma (alergické onemocnění plic, které způsobuje dechové obtíže)

#### **Časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 ze 100 pacientů)**

- pálení v oku (většinou mírné).

#### **Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 1000 pacientů)**

##### Celkové nežádoucí účinky:

- astma
- bolest hlavy

- otok a podráždění nosu, které mohou způsobit pocit ucpaní nosu, kýchání
- sucho v ústech
- neobvyklá chuť v ústech
- svědění

Nežádoucí účinky týkající se oka:

- alergická reakce
- klesající víčko
- oteklé oči
- červené oči
- suché oči
- podrážděné oči
- svědění očí
- zvýšená citlivost očí
- citlivost na světlo
- potíže s ostrým viděním
- výtok z očí

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

## **5. JAK PURIVIST 0,5 mg/ml OČNÍ KAPKY, ROZTOK UCHOVÁVAT**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Purivist po datu použitelnosti (Použitelné do:), které je uvedeno na štítku lahvičky a na krabici.

Nepoužívejte Purivist, pokud kapky změni barvu nebo pokud jeví jakékoliv známky zhoršení, a vraťte přípravek zpět do lékárny.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Lahvičku uchovávejte v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Za 4 týdny po prvním otevření musíte lahvičku přestat používat, i v případě, že v ní ještě zůstaly nějaké kapky. To má zabránit vzniku infekce. Abyste si to lépe zapamatovali, napište si datum otevření lahvičky na krabici.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření mají chránit životní prostředí.

## **6. DALŠÍ INFORMACE**

### **Co PURIVIST 0,5 mg/ml OČNÍ KAPKY, ROZTOK obsahuje**

- Léčivou látkou je epinastini hydrochloridum 0,5 mg/ml.

- Pomocné látky jsou benzalkonium-chlorid (konzervační prostředek), dihydrát edetanu disodného, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný / kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) a čištěná voda.

### **Jak PURIVIST 0,5 mg/ml OČNÍ KAPKY, ROZTOK vypadá a co obsahuje toto balení**

Purivist je čirý bezbarvý roztok očních kapek v lahvičce z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem. Neotevřená lahvička je naplněna pouze do tří čtvrtin a obsahuje 5 ml roztoku. Každé balení obsahuje 1 lahvičku.

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Irsko

Pro další informace o přípravku kontaktujte, prosím, vašeho místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

NEOMED s.r.o  
Sodomkova 6  
102 00 Praha 10  
Tel: 420 274 008 411  
e-mail: [info@neomed.cz](mailto:info@neomed.cz)

Tento přípravek je v členských zemích EHP registrován pod těmito názvy:

Jméno státu	Jméno přípravku
Rakousko, Německo	RELESTAT 0,5 mg/ml Augentropfen
Belgie	RELESTAT, 0,5 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Česká republika	PURIVIST 0.5 mg/ml oční kapky, roztok
Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Lucembursko, Norsko, Polsko, Švédsko	RELESTAT
Francie	PURIVIST (0.5 mg/ml, collyre en solution)
Maďarsko	RELESTAT 0,5 mg/ml oldatos szemcsepp
Irsko, Velká Británie	RELESTAT, 0.5 mg/ml, eye drops solution
Itálie	RELESTAT, 0,5 mg/ml, collirio, soluzione
Nizozemí	RELESTAT, oogdruppels, oplossing, 0,5 mg/ml
Portugalsko	RELESTAT, 0.5 mg/ml, colírio, solução
Slovensko	PURIVIST
Španělsko	RELESTAT 0.5 mg/ml colirio en solución

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.9.2008